

Preparación para esofagogastroduodenoscopia (EGD, siglas en inglés)

Esophagogastroduodenoscopy (EGD) Preparation

Departamento de Gastroenterología de Kaiser en Hayward
27400 Hesperian Blvd., Edificio de consultorios médicos, 2° piso (arriba de la farmacia)

Fecha (Date): _____ Hora (Time): _____ Proveedor (Provider): _____

Esta es la fecha y la hora en las que debe presentarse en el departamento. Se le realizará el procedimiento una vez que se haya completado el trámite de ingreso; aproximadamente entre 45 y 60 minutos después. Planee un total de una a dos horas aproximadamente para el ingreso, el procedimiento y recuperación.

Propósito: Examinar el esófago, estómago y duodeno; hacer una biopsia o extirpar cualquier tumor anormal y cauterizar lesiones sangrantes.

Pruebas de laboratorio: Hágaselas según se lo indicó su médico. *Los pacientes que toman Coumadin deben hacerse el análisis de tiempo de protrombina (PT/labs) el día anterior a la cita.*

Medicamentos (Traiga todos los medicamentos con receta médica, vitaminas y medicamentos de venta sin receta en sus envases originales).

- ❖ **Siete (7) días antes de su procedimiento:** NO TOME HIERRO, ASPIRINA, MOTRIN, ALEVE, RELAFEN, CELEBREX o cualquier otro medicamento antiinflamatorio no corticoesteroide. Tomar Tylenol es seguro.
- ❖ **Día del procedimiento:** **Los pacientes diabéticos** deben revisarse el nivel de azúcar la noche anterior y la mañana del procedimiento.
Insulina: Puede usar ½ (media) dosis de la insulina regular la noche anterior al procedimiento.
NO utilice insulina regular el día de su procedimiento.




Pastillas/comprimidos para la diabetes: Si usted toma pastillas para la diabetes, **NO** las tome la mañana del procedimiento.

Medicamento para la presión arterial alta: Tome su dosis habitual en la mañana del procedimiento con un sorbo de agua.

Dieta

- ❖ **La noche anterior al procedimiento:** No coma nada sólido después de la medianoche.
- ❖ **Día del procedimiento:** **No coma nada sólido.** Solamente puede tomar líquidos claros **hasta seis horas antes de su cita**; después de eso, no debe comer ni beber nada.
- ❖ Al levantarse, **tome los medicamentos que normalmente toma a diario con un sorbo de agua**, con la excepción de los medicamentos para la diabetes mencionados arriba.



Viaje a casa

- ❖ Para este procedimiento estará sedado y se quedará somnoliento por el resto del día. Un adulto responsable **debe llevarlo en automóvil a su casa**. Para su seguridad, si un pariente o amigo no está presente para llevarlo a su casa, **es posible que cancelemos o volvamos a programar** su procedimiento.



Para cancelaciones o preguntas:

Llame al (510) 784-4813 de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12.30 p.m. y de 1.30 p.m. a 5.00 p.m.