



KAISER PERMANENTE®

Sífilis

(Syphilis)

La sífilis es una infección bacteriana que se disemina por el contacto sexual o por compartir agujas contaminadas. Si se deja sin tratar, la sífilis puede ocasionar eventualmente lesiones severas del corazón o del cerebro e incluso la muerte prematura.

El primer síntoma de la sífilis es un pequeño chancro indoloro—una lesión de color rojo, morado o canela—en los genitales, el área rectal o en la boca. Éste comúnmente aparece de dos a 12 semanas después de la exposición a la enfermedad. Desafortunadamente, ya que la llaga es pequeña e indolora, puede no ser notada en un hombre o en una mujer. Sin embargo, esto es particularmente problemático para las mujeres, ya que la llaga puede estar muy profundo en la vagina donde es muy difícil verla. En este caso, ni la mujer ni su pareja sabrá que existe. Por lo general la llaga tiende a desaparecer por su cuenta sin tratamiento en tres a seis semanas; sin embargo,

aunque la úlcera haya desaparecido, esto no significa que la infección no esté presente; simplemente significa que la enfermedad ha pasado a una etapa más avanzada.

Si la sífilis no se descubre y se trata durante esta primera etapa temprana, puede avanzar a una segunda etapa. Entre dos y ocho semanas después de la infección puede aparecer un salpullido de la piel, frecuentemente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Los otros síntomas posibles de esta etapa son pérdida de pelo por parches, fiebre, inflamación glandular, dolor de cabeza, dolores musculares o pérdida de peso. A veces los síntomas de la sífilis se pueden parecer a los de la gripe. Esta segunda etapa de la sífilis también desaparece sin tratamiento.

La tercera, que es la etapa final de la sífilis, puede tomar para notarse diez años o más. Para entonces, muchos órganos internos, tales como el hígado, los vasos sanguíneos a lo largo del cuerpo, el corazón, o el cerebro y el sistema nervioso,

pueden haberse lesionado permanentemente. La muerte prematura ocurre en más o menos la tercera parte de la gente que esté en la etapa avanzada de la sífilis.

La sífilis puede ser detectada examinando una de las llagas, incluso antes de que una prueba de sangre para la sífilis sea positiva. El tratamiento consiste de antibióticos, generalmente inyectados. Pero, aunque la sífilis puede tratarse fácilmente con antibióticos en las etapas anteriores, el tratamiento en la tercera etapa no reparará el daño ya hecho. Por eso es sumamente importante ser conscientes de la posibilidad haber contraído sífilis en una etapa temprana. Ya que es fácil no darse cuenta o ignorar los síntomas de la etapa temprana de la sífilis, si usted practica el sexo inseguro o si comparte agujas, su doctor o su proveedor de salud puede sugerirle que se haga una prueba de sangre para la sífilis en cualquier ocasión que contraiga otra enfermedad de transmisión sexual.

La única manera de eliminar el riesgo de contraer sífilis o cualquier enfermedad de transmisión sexual es tener una relación monógama con un pareja no infectada. Usar condones reducirá pero no eliminará el riesgo. Los espermicidas, la esponja y el diafragma no proveen protección confiable contra enfermedades de transmisión sexual.

Siempre que usted comience una nueva relación sexual, es importante comunicarse honesta y abiertamente con su pareja acerca de si cualquiera de los dos puede haber sido expuesto a una enfermedad de transmisión sexual. Recuerde, es posible estar infectado con sífilis, gonorrea, VIH, clamidia y otras enfermedades aun cuando usted no tenga ningún síntoma.

Llame a su doctor o a su proveedor de salud si usted tiene síntomas de sífilis o quiere que le hagan una prueba para sífilis o para cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Si usted es un adolescente, puede tratarse en California sin el consentimiento o conocimiento de los padres. La ley en este estado garantiza que su tratamiento permanecerá confidencial aun cuando usted sea un menor.



Para mayor información confiable sobre temas de salud:

- Entre al sitio de internet exclusivo para miembros en www.kaiserpermanente.org/california, y cliquee el boton que dice "Kaiser Permanente Members Only"
- Visite el Centro de Educación para la Salud en su establecimiento local de Kaiser Permanente.

- Consulte su copia de "La Salud en Casa: Guía Práctica de Healthwise y Kaiser Permanente.
- Escuche los mensajes del Teléfono de la Salud de Kaiser Permanente llamando al 1-800-332-7563.

Para conseguir una copia gratis del "La Salud en Casa" o del "Directorio del Teléfono de la salud," llame al 1-800-464-4000.

Esta información no se presenta con la intención de diagnosticar problemas de salud o en lugar del cuidado médico profesional. Si tiene problemas de salud persistentes o si tiene más preguntas, por favor, consulte con su doctor o con su proveedor de salud.

© 1998, The Permanente Medical Group, Inc.

REGIONAL HEALTH EDUCATION

7514s